


手足口病の流行警報が発令されました。

【概況】

2017年第28週(7月10日～16日)の定点¹あたりの患者報告数は、横浜市全体で **6.38** と、流行警報発令基準値 5.00 を上回りました。過去、2015年、2013年、2011年に警報基準値を上回っており、前回以来2年ぶりです。直近5週間の報告患者の年齢構成は **1歳(36.1%)** が最も多く、次に **2歳(22.3%)** と、**5歳以下が全体の94.8%** を占めています。全国的に2017年はコクサッキーA6型(CA6)が多くを占めており²、CA6による手足口病では、従来の手足口病より水疱が大きいことや、発症後、数週間後に爪脱落が起こる症例(爪甲脱落症)が報告されています³。今後さらなる流行拡大が予想されるために注意が必要です。

- 1 定点とは、毎週患者発生状況を報告していただいている医療機関(手足口病は小児科定点94か所から報告されています)のことで、そこから報告された患者数の平均値が定点あたりの患者報告数です。
- 2 [手足口病 週別分離・検出報告数\(エンテロウイルス\)、2009～2017年\(国立感染症研究所\)](#)
- 3 [IDWR 2017年第23号<注目すべき感染症> 手足口病\(国立感染症研究所\)](#)


- 1 **市内流行状況**: 第19週で定点あたり0.24、第20週で0.42と増加を開始し、第26週で2.45、第27週で4.13、**第28週で6.38**と急増し、流行警報発令基準値(5.00)を上回りました。



手足口病とは

手足口病は、通常3～6日の潜伏期において、手、足や口腔内(ときに肘、膝やおしりなどにも)に痛みを伴う水疱が出現します。熱は多くが38以下です。1週間程度で自然に治りますが、ごくまれに髄膜炎・脳炎などの重い合併症が起こる場合もあります。元気がない、頭痛・嘔吐を伴う、高熱を伴うなどといった症状が見られた場合は、速やかな受診が必要です。感染経路は飛沫感染、接触感染、経口(糞口)感染であり、乳幼児における感染予防は、手洗いの励行と排泄物の適正な処理が基本です。

2 区別流行状況: 区別では、10区で警報レベル(流行警報発令基準値 5.00)となっています。



学校保健安全法での取り扱い

本疾患は学校において予防すべき感染症の第1種~3種には含まれていませんが、[「学校において予防すべき感染症の解説」](#)(文部科学省)では、「本人の全身状態が安定している場合は登校(園)可能。流行の阻止を狙った登校(園)停止は有効性が低く、またウイルス排出期間が長いことから現実的ではない。」と記載されています。登校・登園については、主治医に相談することが望ましいでしょう。

【お問い合わせ先】横浜市衛生研究所感染症・疫学情報課 TEL 045(370)9237
 横浜市健康福祉局健康安全課 TEL 045(671)2463